



## BROMUS 25 PRO BLOCCO Pasta - De uso profesional

Codice prodotto: 2450619

Categoría: Biocida

Cebo rodenticida en forma de pasta fresca, que viene listo para usar . De uso profesional.

**Registro del Ministerio de Salud italiano::**

IT/2018/00464/AUT

### Características:

BROMUS 25 PRO BLOCCO PASTA es un cebo rodenticida que viene listo para usar, a base de Brodifacoum, una sustancia activa anticoagulante, que resulta efectiva contra el ratón común o doméstico (*Mus musculus*) y la rata de alcantarilla (*Rattus norvegicus*), incluso después de una única ingesta. La formulación consiste en una pasta fresca apetitosa para las especies de roedores indicadas.

El producto no alarma ni suscita sospechas entre los otros miembros de la población de roedores.

BROMUS 25 PRO BLOCCO PASTA contiene una sustancia amarga, encaminada a prevenir la ingestión accidental por parte de los niños.

BROMUS 25 PRO BLOCCO PASTA se puede usar en el interior y alrededor de edificios industriales (incluidos los almacenes, los depósitos y las bodegas de los barcos), rurales, no industriales, viviendas, sótanos, garajes, trasteros y jardines pertinentes.

### Modalidad de uso:

#### DOSIS Y FORMAS DE USO

Uso en el interior de edificios para controlar al ratón común o doméstico (*Mus musculus*).

Coloque 20-40 g de BROMUS 25 PRO BLOCCO PASTA en cada portacebos, que equivalen a 1-2 cebos de pasta fresca listos para usar, de 20 gramos cada uno, o bien a 2-4 cebos de pasta fresca listos para usar, de 10 gramos cada uno.


Donde sea necesario usar más portacebos, colóquelos a una distancia de aproximadamente 10-15 metros entre sí y siempre a una distancia no inferior a 5 metros.

Los portacebos se deberían inspeccionar cada 2 o 3 días al principio del tratamiento y, luego, como mínimo, una vez por semana. Esto permitirá verificar si los portacebos están en buenas condiciones, el consumo del cebo y, de ser preciso, extraer los restos de los roedores. Cuando sea necesario, restaure el nivel inicial de cebo.

Siga todas las demás instrucciones que establecen las buenas prácticas pertinentes.

Uso en el interior de edificios para controlar a la rata de alcantarilla (*Rattus norvegicus*)

Ponga 100-200 g de BROMUS 25 PRO BLOCCO PASTA en cada portacebos, que equivalen a 5-10 cebos de pasta fresca



## BROMUS 25 PRO BLOCCO Pasta - De uso profesional

**"Defensa contra los roedores"**

Rodenticidas

listos para usar, de 20 gramos cada uno, o bien a 10-20 cebos de pasta fresca listos para usar, de 10 g cada uno. Donde sea necesario usar más portacebos, colóquelos a una distancia de aproximadamente 5-10 metros entre sí y siempre a una distancia no inferior a 5 metros.

Los portacebos deberían inspeccionarse cada 5-7 días al principio del tratamiento y, luego, como mínimo, una vez por semana. Ello permitirá verificar si los portacebos están en buenas condiciones, el consumo del cebo y, de ser preciso, extraer los restos de los roedores. Cuando sea necesario, restaure el nivel inicial de cebo.

Siga todas las demás instrucciones que establecen las buenas prácticas pertinentes.

Uso al aire libre y alrededor de edificios para controlar al ratón común o doméstico (*Mus musculus*).

Coloque 20-40 g de BROMUS 25 PRO BLOCCO PASTA en cada portacebos, que equivalen a 1-2 cebos de pasta fresca listos para usar, de 20 gramos cada uno, o bien a 2-4 cebos de pasta fresca listos para usar, de 10 gramos cada uno.

Donde sea necesario usar más portacebos, colóquelos a una distancia de aproximadamente 5-10 metros entre sí y siempre a una distancia no inferior a 5 metros.

Proteja el cebo de los fenómenos atmosféricos (por ejemplo: lluvia, nieve, etc.). Posicione los portacebos en zonas que no se inunden.

Los portacebos llenos deberían controlarse, como mínimo, cada 2 o 3 días al principio del tratamiento y, como mínimo, una vez por semana a continuación, a fin de controlar si a los roedores les apetece el cebo, si los portacebos están en buenas condiciones y para extraer los restos de los roedores. Vuelva a llenar el portacebos cuando sea necesario.

Cambie los cebos de los portacebos si el agua los ha arruinado o están sucios.

Siga todas las demás instrucciones que establecen las buenas prácticas pertinentes.

Uso al aire libre y alrededor de edificios para controlar a la rata de alcantarillas (*Rattus norvegicus*).

Ponga 100-200 g de BROMUS HOBBY PASTA en cada portacebos, que equivalen a 5-10 cebos de pasta fresca listos para usar, de 20 gramos cada uno, o bien a 10-20 cebos de pasta fresca listos para usar, de 10 gramos cada uno.


Donde sea necesario usar más portacebos, colóquelos a una distancia de aproximadamente 5-10 metros entre sí y siempre a una distancia no inferior a 5 metros.

Proteja el cebo de los fenómenos atmosféricos (por ejemplo: lluvia, nieve, etc.). Posicione los portacebos en zonas que no se inunden.

Los portacebos llenos deberían controlarse como mínimo cada 5-7 días al principio del tratamiento y, como mínimo, una vez por semana a continuación, a fin de controlar si a los roedores les apetece el cebo, si los portacebos están en buenas condiciones y para extraer los restos de los roedores. Vuelva a llenar el portacebos cuando sea necesario.

Cambie los cebos de los portacebos si el agua los ha arruinado o están sucios.

Siga todas las demás instrucciones que establecen las buenas prácticas pertinentes.



## BROMUS 25 PRO BLOCCO Pasta - De uso profesional

**"Defensa contra los roedores"**

Rodenticidas

**Tipos de uso:**

Profesional

**Advertencias:**

Antes de usar el producto lea y siga al pie de la letra las instrucciones sobre el mismo, así como la ficha adjunta, o los datos que le faciliten en el punto de venta.

Antes de posicionar los cebos, inspeccione la zona infestada e identifique *in situ* las especies de roedores y los espacios por donde se mueven. Determine la causa probable y la magnitud de la infestación.

Saque del lugar las fuentes de alimentos que puedan alcanzar fácilmente los roedores (por ejemplo: granos de cereales desparramados por el piso o trozos de alimentos).

Además, no limpie la zona infestada inmediatamente antes del tratamiento, porque ello molesta solamente a la población de roedores y hace que resulte más difícil conseguir que acepten el cebo.

Use el producto exclusivamente en el marco del sistema de Manejo Integrado de Plagas (MIP), que, entre otras cosas, incluye medidas de higiene. Donde sea posible, use métodos físicos de control.

Baraje la posibilidad de tomar medidas preventivas de control (por ejemplo: cegar las cuevas y eliminar todas las fuentes de alimentos y agua, de ser viable) para constatar la cantidad de producto consumida y lograr que disminuya la posibilidad de una reinfestación.

Los portacebos se ubicarán lo más cerca posible de los lugares en que se haya detectado anteriormente la actividad de los roedores (por ejemplo: senderos, nidos, corrales de ganado, cuevas, madrigueras, etc.).

Cuando resulte viable, ancle los portacebos contra el piso u otras estructuras. Los portacebos se etiquetarán claramente indicando que contienen rodenticidas y que no hay que eliminarlos ni abrirlos.

Cuando el producto se use en lugares públicos, hay que señalizar los espacios tratados mientras dure el tratamiento. Junto a los cebos, hay que colocar un aviso que indique el riesgo de envenenamiento primario y secundario vinculado al anticoagulante y las medidas de primeros auxilios a aplicar en caso de envenenamiento.

Sujete el cebo de manera tal que no lo puedan extraer del portacebos.

Posicione el producto fuera del alcance de los niños, pájaros, animales domésticos, animales de corral y otros animales no diana.

Posicione el producto lejos de la comida, bebidas y piensos para animales, al igual que de herramientas o superficies que pueden entrar en contacto con el producto.

Al manipular el producto, use guantes de protección resistentes a las sustancias químicas

No coma, no beba ni fume mientras esté usando el producto. Lávese las manos y la epidermis expuesta directamente después de usar el producto.

Si los roedores consumen poco cebo en comparación con la magnitud evidente de la infestación, analice la conveniencia de ubicar los puntos cebo en otros sitios y la posibilidad de cambiar el tipo de formulación del cebo.

Si, al cabo de 35 días de tratamiento, los roedores siguen consumiendo los cebos pero no se aprecia que haya disminuido su actividad, es necesario que determine la causa más probable. Si ya ha descartado otras causas, es probable que haya roedores resistentes: por tanto, estudie la posibilidad de usar un rodenticida no-anticoagulante o de un rodenticida anticoagulante más efectivo, toda vez que estén disponibles. Además, evalúe usar trampas como medida alternativa de control.

Al final del periodo de tratamiento, saque del lugar los cebos restantes o los portacebos llenos.

Los portacebos tienen que llevar etiquetas con la siguiente información: "no cambie de lugar ni abra"; "contiene un rodenticida"; "nombre del producto o número de autorización"; "sustancia/s activa/s" y "en caso de accidente, consulte un centro antivenenos".

El producto es peligroso para la fauna silvestre.

**Paquetes de venta:**

SOBRE 1.5 KG

**Nota:**

Use todo biocida con cautela. Antes de usar el producto, lea siempre la etiqueta y la información sobre el mismo.

Preste suma atención a las frases y los símbolos de peligro que se aprecian en la etiqueta.

El texto que figura en la ficha corresponde a la etiqueta que aprobó el Ministerio de Sanidad.