



## FEROMONE TRIBOLIUM SITOPHILUS-Strisc.

**Codice prodotto: 1900040**

**Categoria: Assente**

Feromoni sessuali specifici per la cattura degli insetti striscianti

### Caratteristiche:

Sistema di rilascio graduale da utilizzare nelle apposite trappole per la cattura degli insetti striscianti che tipicamente infestano le derrate alimentari: *Tribolium castaneum* (Tribolio castano o della farina) *Tribolium confusum* (Tribolio nero o del riso), *Sitophilus oryzae* (Punteruolo del riso) e *Sitophilus granarius* (Punteruolo del grano).

Gli adulti di questi insetti vengono attratti da una capsula che rilascia gradualmente gli specifici feromoni di richiamo e sono quindi indotti ad entrare nella trappola. Nel tentativo di raggiungere la fonte del feromone gli insetti restano attaccati al cartoncino collante interno.

### Modalità d'impiego:

Montaggio: seguire le indicazioni contenute nel foglietto illustrativo.

Installazione: collocare la trappola con l'apposita base negli angoli o lungo il perimetro dei locali infestati o da monitorare ed attivarla con la capsula contenente il feromone specifico per l'infestante target. Installare la trappola non solo dove già si sospetta la presenza dell'infestazione, ma anche nei locali e nei corridoi circostanti. L'impiego dell'apposito guscio rigido, fissabile con silicone o tasselli, consente di ridurre la precarietà della trappola, proteggendola da urti e da polvere, evitando gli spostamenti accidentali in seguito a pulizie o altre rimozioni involontarie. Inoltre, rendendo la reperibilità delle postazioni immediata, velocizza le operazioni di monitoraggio.

Sostituzione capsula attrattiva: una volta estratta dalla confezione protettiva, la capsula è attiva per circa 60 giorni. Le capsule di scorta vanno conservate in luogo fresco o, meglio ancora, in frigorifero; così conservate si mantengono attive per un periodo di almeno 24 mesi. Le capsule esaurite non devono restare all'interno dello stabilimento o magazzino, ma vanno immediatamente smaltite.

Rilevazione dei dati: ispezionare regolarmente le trappole e, nel caso siano stati catturati degli insetti, conteggiarli almeno una volta alla settimana trascrivendo i dati ottenuti. L'analisi di tali dati costituisce infatti il migliore strumento per stabilire qual è il momento di intervenire con un trattamento insetticida.

### Tipologia di utilizzo:

Professionale

### Confezioni di vendita:



Revisione: 2026

*Scheda Tecnica*

**FEROMONE TRIBOLIUM SITOPHILUS-Strisc.**

***"Difesa degli ambienti"***

**Trappole elettroluminose**

Feromone "verde" – Astuccio 3x3 capsule, scatola 10 pezzi