



RATADIOL™ PASTA FRESCA PLUS 5kg

Codice prodotto: 2538242AP

Categoria: Biocida

Esca Rodenticida pronta all'uso in forma di pasta fresca USO PROFESSIONALE CATEGORIA DI UTILIZZATORI: PROFESSIONISTI AREA DI UTILIZZO INTERNO ed INTORNO AGLI EDIFICI

Registrazione Ministeriale:

IT/2013/00086/AUT

Composizione:

100 grammi di prodotto contengono:

Bromadiolone (N°CAS 28772-56-7): 0,005g

Denatonio Benzoato (N°CAS 3734-33-6): 0,001g

Caratteristiche:

RATADIOL™ PASTA FRESCA PLUS è un'esca rodenticida pronta all'uso a base di una sostanza attiva anticoagulante, denominata Bromadiolone, efficace contro Topolino domestico (*Mus musculus*), Ratto grigio (*Rattus norvegicus*) e Ratto nero (*Rattus rattus*), anche dopo una singola ingestione. La formulazione consiste in una pasta appetibile per le specie di roditori indicate. Il prodotto non allerta e non ingenera sospetti agli altri componenti della popolazione di roditori. RATADIOL™ PASTA FRESCA PLUS contiene una sostanza amaricante atta a prevenire l'ingestione accidentale da parte dei bambini. RATADIOL™ PASTA FRESCA PLUS può essere usato all'interno e intorno a edifici industriali (inclusi magazzini, depositi, stive delle navi), rurali, civili, abitazioni, cantine, garage, ripostigli, giardini ed aree esterne di pertinenza.

ORGANISMI TARGET Topolino domestico (*Mus musculus*), sia giovani che adulti, Ratto grigio (*Rattus norvegicus*), sia giovani che adulti e Ratto nero (*Rattus rattus*) sia giovani che adulti. **MODALITÀ APPLICATIVE** RATADIOL™ PASTA FRESCA PLUS è un'esca pronta all'uso in forma di pasta, da utilizzare esclusivamente in contenitori per esche a prova di manomissione, debitamente marcati, protette dagli agenti atmosferici, dall'ingestione di specie non bersaglio e da dispersione nell'ambiente. Aroma: salmone

Modalità d'impiego:

Utilizzare il prodotto conformemente ai dosaggi sotto riportati all'interno di appositi contenitori. Laddove dovessero essere

necessari più contenitori posizzionarli ad una distanza di circa 5-10 metri l'uno dall'altro e comunque ad una distanza non inferiore ai 5 metri. Ispezionare i contenitori dopo il periodo prescritto da ogni uso. Ciò al fine di verificare l'integrità dei contenitori, il consumo dell'esca, ed eventualmente per rimuovere le carcasse dei roditori. Quando necessario reintegrare l'esca. Proteggere l'esca dalle condizioni atmosferiche (ad es. pioggia, neve, ecc). Posizionare i contenitori con l'esca in zone non soggette ad allagamenti. In caso di posizionamento di punti esca in prossimità di sistemi di drenaggio delle acque, prevenire che l'esca entri in contatto con l'acqua. Sostituire le esche nei contenitori se danneggiate dall'acqua o contaminate dalla sporcizia. Non applicare questo prodotto direttamente nelle tane. Seguire ogni ulteriore istruzione prevista dalle buone pratiche pertinenti.

Uso all'interno di edifici per il controllo del Topolino domestico. Posizionare 40 g di RATADIOL™ PASTA FRESCA PLUS per contenitore, pari a 2 esche in pasta fresca pronte all'uso da 20 grammi ciascuna. I contenitori dovrebbero essere ispezionati ogni 2-3 giorni all'inizio del trattamento e poi almeno settimanalmente.

Uso all'interno di edifici per il controllo del Ratto grigio e Ratto nero. Posizionare 60-100 g di RATADIOL™ PASTA FRESCA PLUS per contenitore, pari a 3-5 esche in pasta fresca pronte all'uso da 20 grammi ciascuna. I contenitori dovrebbero essere ispezionati ogni 5-7 giorni all'inizio del trattamento e poi almeno settimanalmente.

Uso intorno agli edifici per il controllo del Topolino domestico. Posizionare 40 g di RATADIOL™ PASTA FRESCA PLUS per contenitore, pari a 2 esche in pasta fresca pronte all'uso da 20 grammi ciascuna. I contenitori con le esche dovrebbero essere controllati almeno ogni 2-3 giorni all'inizio del trattamento e poi almeno settimanalmente.

Uso intorno agli edifici per il controllo del Ratto grigio e Ratto nero. Posizionare 60-100 g di RATADIOL™ PASTA FRESCA PLUS per contenitore, pari a 3-5 esche in pasta fresca pronte all'uso da 20 grammi ciascuna. I contenitori con le esche dovrebbero essere controllati almeno ogni 5-7 giorni all'inizio del trattamento e poi almeno settimanalmente.

Tipologia di utilizzo:

Professionale

Avvertenze:

Prima dell'uso leggere e seguire le istruzioni riportate sull'imballo del prodotto così come le informazioni in accompagnamento al prodotto o fornite presso il punto vendita. Prima del posizionamento delle esche, procedere ad un sopralluogo dell'area infestata e ad una valutazione in loco al fine d'identificare la specie di roditori, i luoghi d'attività e determinare la probabile causa e l'entità dell'infestazione. Rimuovere le fonti di cibo facilmente raggiungibili da parte dei roditori (ad esempio granaglie fuoriuscite o scarti di cibo). Inoltre, non ripulire l'area infestata appena prima del trattamento, dato che ciò disturba solamente la popolazione di roditori e rende più difficile ottenere l'accettazione dell'esca. Il prodotto deve essere usato unicamente all'interno del sistema di gestione integrata delle infestazioni (IPM), che include, fra l'altro, anche misure d'igiene e, dove possibile, metodi fisici di controllo. I contenitori con l'esca devono essere posizionati nelle immediate vicinanze di luoghi in cui l'attività dei roditori è stata verificata in precedenza (ad esempio camminamenti, nidi, recinti d'entrata di bestiame, aperture, tane, ecc.). Ove possibile, fissare i contenitori per esca al suolo o ad altre strutture. I contenitori per esche devono essere chiaramente etichettati segnalando che contengono rodenticidi e che non devono essere rimossi o aperti. Quando il prodotto è utilizzato in aree pubbliche, le zone trattate devono essere segnalate durante il periodo di trattamento. Accanto alle esche, deve essere reso disponibile un avviso indicante il rischio di avvelenamento primario e

secondario da anticoagulante e le misure di primo soccorso da seguire in caso di avvelenamento. L'esca deve essere fissata in modo da non essere trascinata fuori dal contenitore per esche. Posizionare il prodotto fuori dalla portata di bambini, uccelli, animali domestici, animali da fattoria e altri animali non bersaglio. Posizionare il prodotto lontano da cibi, bevande e alimenti per animali, nonché da utensili o superfici che possono entrare in contatto con il prodotto. Durante la fase di manipolazione del prodotto, indossare guanti di protezione resistenti alle sostanze chimiche (UNI EN 374 PF>4). Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso del prodotto. Lavare le mani e la pelle direttamente esposta dopo l'utilizzo del prodotto. La frequenza delle visite all'area trattata dovrebbe essere a discrezione dell'operatore, alla luce dell'indagine condotta all'inizio del trattamento. Tale frequenza dovrebbe essere coerente con le raccomandazioni fornite dal relativo codice di buone pratiche.

Se il consumo dell'esca è basso rispetto alla dimensione evidente dell'infestazione, valutare il riposizionamento dei punti esca in altri luoghi e la possibilità di cambiare tipo formulazione d'esca. Se, trascorso un periodo di trattamento di 35 giorni, le esche vengono ancora consumate e non si osserva una diminuzione nell'attività dei roditori, è necessario determinarne la causa più probabile. Qualora altri elementi siano stati già esclusi, è probabile che vi siano roditori resistenti: considerare, quindi, ove disponibile, l'uso di un rodenticida non-anticoagulante o di un rodenticida anticoagulante più efficace. Considerare, inoltre, l'uso di trappole quale misura alternativa di controllo. Al termine del periodo di trattamento rimuovere le esche rimaste o i contenitori con le esche. Non aprire i sacchetti contenenti l'esca. Pericoloso per la fauna selvatica.

Confezioni di vendita:

secchio 5 kg

Informazioni per lo smaltimento:**Riciclamo insieme**

Componente	Materiale		Informazioni aggiuntive
Secchio	plastica	PP 05	Raccolta Plastica
Coperchio	plastica	PP 05	Raccolta Plastica
Sacco	plastica	LDPE 4	Il prodotto contiene un rodenticida, prima di procedere con la raccolta differenziata verifica le disposizioni del tuo comune

CONSULTA LE INDICAZIONI DEL TUO COMUNE**Note:**

Usare i biocidi con cautela. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto. Si richiama l'attenzione sulle frasi e sui simboli di pericolo riportati in etichetta.



Revisione: 2026

Scheda Tecnica

RATADIOL™ PASTA FRESCA PLUS 5kg

"Difesa dai roditori"

Rodenticidi

Il testo riportato nella scheda corrisponde all'etichetta approvata dal Ministero della Salute.

03/01/2019



Revisione: 2026

Scheda Tecnica

RATADIOL™ PASTA FRESCA PLUS 5kg

"Difesa dai roditori"

Rodenticidi